

Istruzioni **VIRESCO®** Pratens

Il seme è un materiale vivo. La sua crescita dipende da vari fattori tra cui il clima, l'irrigazione, il tipo di terreno. Si consiglia quindi di posare VIRESCO® con una temperatura stabilmente superiore a 5° e inferiore a 30°. Si prega inoltre di seguire attentamente le istruzioni d'uso qui riportate. Le componenti utilizzate sono di 1ª qualità, ma non è possibile garantire un buon risultato in caso di assenza d'acqua, avverse condizioni climatiche, errori nell'utilizzo o inerbimenti di situazioni critiche.

- Stendere il biofeltro preseminato **VIRESCO®** ad una temperatura ambiente compresa tra 5° e 30°.
- Preparare il terreno eliminando tutte le erbacce dalla radice, rivoltando i primi 5/8 cm di superficie e livellando.
- In caso di substrati scadenti riportare qualche centimetro di terreno vegetale fertile (terriccio, lapillo fine o mix torba e sabbia).
- Srotolare **VIRESCO®** in un luogo con buona esposizione luminosa anche se ombreggiata. Non allungare o tirare, ma adagiarlo facendolo **aderire stabilmente al terreno**.
- **NON SORMONTARE TRA DI LORO I ROTOLI DI VIRESCO®, MA AFFIANCARLI.**
- Si può ritagliare e modellare a piacimento con semplici forbici.
- **IRRIGARE quotidianamente fino alla completa emergenza del manto erboso** (prime specie in 7/10 giorni, le più tardive in 25/30 giorni), con una frequenza maggiore per le superfici molto inclinate. **Cicli d'irrigazione brevi, ma frequenti.**
- Se si ha difficoltà a irrigare regolarmente si può coprire **VIRESCO®** con qualche millimetro di terriccio e irrigare ogni 1/2 giorni.
- Dopo circa 1 mese irrigare secondo le esigenze.
In seguito trattare il prato normalmente (possibilità di calpestio, uso del rasaerba).
- Primo taglio quando raggiunge 10/15 cm di altezza a non meno di 5 cm.
- In caso di pendenze o vento è consigliabile fissare **VIRESCO®** con i nostri picchetti o leggeri chiodi a U.

Con il **prato fiorito** è consigliabile non rasare più di due volte all'anno (generalmente a giugno-luglio e settembre-ottobre) a non meno di 5 cm di altezza e quindi è maggiormente indicato per aree a basso sfruttamento poco calpestate.

Periodo ottimale di posa settembre-ottobre. Anche la semina in primavera è possibile, a patto che l'area seminata possa essere irrigata regolarmente. Nella stagione successiva procedere al primo sfalcio dopo che le specie annuali (es. papavero, fiordaliso) hanno terminato la fioritura.

Queste andranno progressivamente a scomparire a beneficio delle specie perenni.

Periodi indicativi per gli sfalci giugno e settembre. Per limitare l'altezza procedere con il taglio ad aprile-maggio. Non effettuare concimazioni aggiuntive.

VIRESCO® può essere appoggiato su entrambi i lati.

VIRESCO® è un prodotto di origine totalmente naturale, biodegradabile al 100% in un tempo variabile fra i 3 e i 4 mesi a seconda del tipo di terreno e delle condizioni climatiche e ambientali.

VIRESCO®, conservato all'asciutto all'interno del nylon d'imballaggio, ha una durata di ca. due anni.