

Istruzioni **VIRESCO®** Pratens

Il seme è un materiale vivo. La sua crescita dipende da vari fattori tra cui il clima, l'irrigazione, il tipo di terreno. Si consiglia quindi di posare **VIRESCO®** con una temperatura stabilmente superiore a 8°-10° e inferiore a 30°. Si prega inoltre di seguire attentamente le istruzioni d'uso qui riportate. Le componenti utilizzate sono di 1ª qualità, ma non è possibile garantire un buon risultato in caso di avverse condizioni climatiche, errori nell'utilizzo o inerbimenti di situazioni critiche.

- Stendere il biofello preseminato **VIRESCO®** ad una temperatura ambiente compresa tra 10° e 30°.
- Preparare il terreno eliminando tutte le erbacce dalla radice, rivoltando i primi 5/8 cm di superficie e livellando.
- In caso di substrati scadenti riportare qualche centimetro di terreno vegetale fertile (lapillo fine o mix torba e sabbia).
- Srotolare **VIRESCO®** in un luogo con buona esposizione luminosa anche se ombreggiata. Non allungare o tirare, ma adagiarlo facendolo **aderire stabilmente al terreno**.
- **NON SORMONTARE TRA DI LORO I ROTOLI DI VIRESCO®, MA AFFIANCARLI.**
- Si può ritagliare e modellare a piacimento con semplici forbici.
- **Irrigare** quotidianamente fino alla completa emergenza del manto erboso (prime specie in 7/10 giorni, le più tardive in 25/30 giorni), con una frequenza maggiore per le superfici molto inclinate. Cicli d'irrigazione brevi, ma frequenti.
- Se si ha difficoltà a irrigare regolarmente si può coprire **VIRESCO®** con qualche millimetro di terriccio e irrigare ogni 1/2 giorni.
- Dopo circa 1 mese irrigare secondo le esigenze.

In seguito trattare il prato normalmente (possibilità di calpestio, uso del rasaerba).

- Primo taglio quando raggiunge 10/15 cm di altezza a non meno di 5 cm.
- In caso di pendenze o vento è consigliabile fissare **VIRESCO®** con i nostri picchetti o leggeri chiodi a U.
- Con il prato fiorito è consigliabile non rasare più di due volte all'anno (generalmente a giugno-luglio e settembre-ottobre) a non meno di 5 cm di altezza e quindi è maggiormente indicato per aree a basso sfruttamento poco calpestate.

Periodo ottimale di posa settembre-ottobre. Anche la semina in primavera è possibile, a patto che l'area seminata possa essere irrigata regolarmente. Nella stagione successiva procedere al primo sfalcio dopo che le specie annuali (es. papavero, fiordaliso) hanno terminato la fioritura.

Queste andranno progressivamente a scomparire a beneficio delle specie perenni.

Periodi indicativi per gli sfalci giugno e settembre. Per limitare l'altezza procedere con il taglio ad aprile-maggio.

Non effettuare concimazioni aggiuntive.

VIRESCO® può essere appoggiato su entrambi i lati.

VIRESCO® è un prodotto di origine totalmente naturale, biodegradabile al 100% in un tempo variabile fra i 3 e i 4 mesi a seconda del tipo di terreno e delle condizioni climatiche e ambientali.

Conservato all'asciutto all'interno del proprio nylon d'imballaggio ha una durata di oltre 1 anno.